


## موجک‌ها و جبرخطی

<http://wala.vru.ac.ir>



دانشگاه ولیعصر (عج)

رفسنجان

## یک کران برای حدس فایتینگر

محمدعلی حسنخانی فردآ

گروه ریاضی، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان، رفسنجان، ایران

### چکیده

در این مقاله با استفاده از تبدیل فوریه گسسته در فضای با بعد متناهی  $\mathbb{C}^n$ ، یک کلاس از قاب‌های کیپ هم‌نرم ریس ناپذیر معرفی می‌شود و با استفاده از کلاس مذکور یک کران برای حدس فایتینگر ارائه می‌شود. طبق حدس فایتینگر که البته اخیراً ثابت شده است، برای  $A, C > 0$  داده شده یک ثابت کلی  $\delta > 0$  مستقل از  $n$  وجود دارد به طوری که هر قاب  $A$ -کیپ  $C$ -هم‌نرم در  $\mathbb{C}^n$  می‌تواند به  $r$  دنباله پایه ریس با کران پایین پایه ریس  $\delta$  افزایش شود. در این مقاله نشان داده می‌شود که  $r > \frac{A}{C^2}$ .

موجک‌ها و جبرخطی (۱۳۹۷) ©

### اطلاعات مقاله

تاریخچه مقاله:

دریافت شده: ۱۹ دی ۱۳۹۶

پذیرفته شده: ۱ خرداد ۱۳۹۷

دسترسی آنلاین: ۷ مرداد ۹۷

ادیتور رابط: فرشید عبداللہی

کلمات کلیدی:

دنباله پایه ریس، قاب

کیپ، حدس فایتینگر،

دنباله  $(\delta, r)$ -ریس پذیر.

آدرس ایمیلها: [m.hasankhani@vru.ac.ir](mailto:m.hasankhani@vru.ac.ir) (محمدعلی حسنخانی فرد).

<http://doi.org/10.22072/wala.2018.79107.1147>

موجک‌ها و جبرخطی (۱۳۹۷) ©

## ۱. مقدمه

فرض کنید  $\mathcal{H}$  یک فضای هیلبرت جدایی پذیر با ضرب داخلی  $\langle \cdot, \cdot \rangle$  باشد. دنباله  $\{f_k\}_{k=1}^{\infty}$  یک قاب برای  $\mathcal{H}$  است اگر ثابت‌های  $A > 0$ ،  $B < \infty$  وجود داشته باشد به طوری که برای هر  $f \in \mathcal{H}$ ،

$$A\|f\|^2 \leq \sum_{k=1}^{\infty} |\langle f, f_k \rangle|^2 \leq B\|f\|^2, \quad (1.1)$$

که در آن  $A, B$  به ترتیب کران‌های پایین و بالای قاب نامیده می‌شوند. نامساوی دومی در شرط قاب (۱.۱) شرط بسل<sup>۱</sup> برای دنباله  $\{f_k\}_{k=1}^{\infty}$  است. اگر  $A = B$ ، آنگاه قاب  $\{f_k\}_{k=1}^{\infty}$  را یک قاب کیپ و اگر  $A = B = 1$  آنگاه  $\{f_k\}_{k=1}^{\infty}$  را یک قاب کیپ نرمال شده یا قاب پارسوال گویند.

اگر همه اعضای قاب دارای نرم یکسان باشند قاب را قاب هم‌نرم نامند، به ویژه اگر  $\{f_k\}_{k=1}^{\infty}$  یک قاب کیپ با کران قاب  $A$  باشد به طوری که برای هر  $k \in \mathbb{N}$  داشته باشیم  $\|f_k\| = C$  آنگاه  $\{f_k\}_{k=1}^{\infty}$  را یک قاب  $A$ -کیپ  $C$ -هم‌نرم گویند.

قاب  $\{f_k\}_{k=1}^{\infty}$  را یک قاب کراندار گویند اگر یک ثابت مثبت  $\lambda$  وجود داشته باشد به طوری که برای هر  $k \in \mathbb{N}$  داشته باشیم  $\|f_k\| \geq \lambda$ . دنباله  $\{f_k\}_{k=1}^{\infty}$  یک دنباله قاب نامیده می‌شود اگر یک قاب برای  $\overline{\text{span}}\{f_k\}_{k=1}^{\infty}$  باشد.

عملگر خطی کراندار

$$T : \ell_2(\mathbb{N}) \rightarrow \mathcal{H}, \quad T\{c_k\}_{k=1}^{\infty} = \sum_{k=1}^{\infty} c_k f_k$$

را عملگر قاب اولیه و عملگر خطی کراندار

$$S : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}, \quad S f = \sum_{k=1}^{\infty} \langle f, f_k \rangle f_k$$

را عملگر قاب برای قاب  $\{f_k\}_{k=1}^{\infty}$  گویند.

<sup>1</sup>Bessel

یک پایه ریس برای  $\mathcal{H}$  یک دنباله به صورت  $\{Ue_k\}_{k=1}^{\infty}$  است که در آن  $\{e_k\}_{k=1}^{\infty}$  یک پایه متعامد یکه برای  $\mathcal{H}$  و  $U \in B(\mathcal{H})$  یک عملگر معکوس پذیر است. هر پایه ریس یک قاب برای  $\mathcal{H}$  است. دنباله  $\{f_k\}_{k=1}^{\infty}$  یک پایه ریس است اگر و تنها اگر کامل باشد و ثابت‌های  $0 < A \leq B < \infty$  وجود داشته باشد به طوری که برای هر دنباله متناهی  $\{c_k\}_{k \in I}$  از اعداد مختلط داشته باشیم:

$$A \sum_{k \in I} |c_k|^2 \leq \left\| \sum_{k \in I} c_k f_k \right\|^2 \leq B \sum_{k \in I} |c_k|^2,$$

که در آن  $A, B$  به ترتیب کران پایه ریس پایین و کران پایه ریس بالای  $\{f_k\}_{k=1}^{\infty}$  نامیده می‌شوند. دنباله  $\{f_k\}_{k=1}^{\infty}$  یک دنباله پایه ریس نامیده می‌شود اگر یک پایه ریس برای  $\overline{\text{span}}\{f_k\}_{k=1}^{\infty}$  باشد. برای هر  $a, b \in \mathbb{R}$  عملگر انتقال و عملگر مدولی روی  $L_2(\mathbb{R})$  به ترتیب با

$$(T_a g)(x) = g(x - a), \quad (E_b g)(x) = e^{i\pi b x} g(x), \quad \forall x \in \mathbb{R},$$

تعریف می‌شوند. یک قاب گابور یک قاب برای فضای هیلبرت  $L_2(\mathbb{R})$  به صورت  $\{E_{mb} T_{na} g\}_{m,n \in \mathbb{Z}}$  است که در آن  $a, b > 0$  و  $g$  یک تابع ثابت در  $L_2(\mathbb{R})$  است. برای اطلاعات بیشتر درباره قاب‌ها به مراجع [۳، ۴، ۷] مراجعه کنید.

فایتینگر<sup>۲</sup> در مطالعه قاب‌های گابور متوجه شد همه مثال‌های قاب‌های گابور دارای این خاصیت هستند که به صورت اجتماع متناهی از دنباله‌های پایه ریس نوشته می‌شوند و این حدس را پیشنهاد داد: حدس فایتینگر: هر قاب کراندار را می‌توان به صورت اجتماع متناهی از دنباله‌های پایه ریس نوشت. در مرجع [۱] نشان داده شده است که حدس فایتینگر با حدس فیچتنگر متناهی هم ارز است.

حدس فایتینگر متناهی: برای هر  $B, C > 0$  یک عدد طبیعی  $r = r(B, C)$  و یک عدد  $0 < A = A(B, C)$  وجود دارد به طوری که اگر  $\{f_i\}_{i \in I}$  یک قاب برای  $\mathbb{C}^n$  با کران بالای قاب  $B$  باشد و  $\|f_i\| \geq C$  برای هر  $i \in I$ ، آنگاه  $I$  را می‌توان به مجموعه‌های  $\{I_j\}_{j=1}^r$  افراز کرد به طوری که برای هر  $1 \leq j \leq r$  دنباله  $\{f_i\}_{i \in I_j}$  یک دنباله پایه ریس با کران پایه ریس پایین  $A$  و کران پایه ریس بالای  $B$  است.

<sup>2</sup>Feichtinger

حدس فایتینگر با مساله مشهور کیدیسون-سینگر<sup>۳</sup> هم ارز است و این مساله اخیرا ثابت شده است [۵، ۶]. بنابراین هر قاب کراندار را می‌توان به زیر مجموعه‌هایی که دنباله پایه ریس هستند، افراز کرد. در این مقاله روی تعداد این زیر مجموعه‌ها کار می‌کنیم و در واقع یک کلاس از قاب‌های  $A$ -کیپ  $C$  هم‌نرم ارائه می‌دهیم که نمی‌توان آن را به  $r$  دنباله پایه ریس افراز کرد که در آن  $r \leq \frac{A}{C}$ ،  $\delta > 0$  و  $C \in \sqrt{\frac{A}{\mathbb{N}}} := \{ \sqrt{\frac{A}{m}} | m \in \mathbb{N} \}$ .

## ۲. قاب‌های ریس پذیر

در این بخش با استفاده از تبدیل فوریه گسسته در  $\mathbb{C}^n$  یک کلاس از قاب‌های کیپ هم‌نرم می‌سازیم. **تعریف ۱.۲.** فرض کنید  $r \in \mathbb{N}$ ،  $r \geq 2$  و  $\delta > 0$ . یک خانواده از بردارها  $\{f_i\}_{i=1}^m$  برای فضای هیلبرت  $n$ -بعدی  $\mathcal{H}_n$  را  $(\delta, r)$ -ریس پذیر گویند اگر یک افراز  $\{I_j\}_{j=1}^r$  از مجموعه  $\{1, 2, \dots, m\}$  وجود داشته باشد به‌طوری‌که برای همه  $j \in \{1, 2, \dots, r\}$  و اسکالرهای  $\{c_i\}_{i \in I_j}$  داشته باشیم:

$$\left\| \sum_{i \in I_j} c_i f_i \right\|^2 \geq \delta \sum_{i \in I_j} |c_i|^2.$$

چون حدس فایتینگر اکنون ثابت شده است لذا  $\delta > 0$  مستقل از  $n$  و  $r \geq 2$  وجود دارند به‌طوری‌که هر قاب کراندار  $\{f_i\}_{i=1}^m$  برای فضای هیلبرت  $n$ -بعدی  $\mathcal{H}_n$ ،  $(\delta, r)$ -ریس پذیر است [۱]. اکنون این سوال مطرح است:

فرض کنید  $r \geq 2$  داده شده است، آیا یک  $\delta > 0$  مستقل از  $n$  وجود دارد به‌طوری‌که هر قاب کراندار  $\{f_i\}_{i=1}^m$  برای فضای هیلبرت  $n$ -بعدی  $\mathcal{H}_n$ ،  $(\delta, r)$ -ریس پذیر باشد؟ در مرجع [۲] نشان داده شده است که یک قاب ۲-کیپ ۱-هم‌نرم وجود دارد به‌طوری‌که برای هر  $\delta > 0$ ،  $(\delta, 2)$ -ریس پذیر نیست.

در گزاره زیر قاب‌های  $A$ -کیپ در  $\mathbb{C}^n$  کاملا مشخص می‌شوند.

**گزاره ۲.۲.** [۳] یک دنباله  $\{f_i\}_{i=1}^m$  از بردارها در  $\mathbb{C}^n$  یک قاب  $A$ -کیپ برای  $\mathbb{C}^n$  است اگر و تنها اگر

<sup>3</sup>Kadison-Singer

ماتریسی که سطرهای آن  $f_i$  ها است دارای ستونهای متعامد باشد و مجموع توان دوم اعداد ستونهای آنها برابر  $A$  شود.

فرض کنید  $D_n$  تبدیل فوریه گسسته  $n \times n$  به صورت زیر باشد:

$$D_n = \frac{1}{\sqrt{n}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 & 1 \\ 1 & e^{\frac{2\pi i}{n}} & e^{\frac{4\pi i}{n}} & \dots & e^{\frac{2\pi i(n-2)}{n}} & e^{\frac{2\pi i(n-1)}{n}} \\ 1 & e^{\frac{4\pi i}{n}} & e^{\frac{8\pi i}{n}} & \dots & e^{\frac{4\pi i(n-2)}{n}} & e^{\frac{4\pi i(n-1)}{n}} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 1 & e^{\frac{2\pi i(n-2)}{n}} & e^{\frac{4\pi i(n-2)}{n}} & \dots & e^{\frac{2\pi i(n-2)(n-2)}{n}} & e^{\frac{2\pi i(n-2)(n-1)}{n}} \\ 1 & e^{\frac{2\pi i(n-1)}{n}} & e^{\frac{4\pi i(n-1)}{n}} & \dots & e^{\frac{2\pi i(n-1)(n-2)}{n}} & e^{\frac{2\pi i(n-1)(n-1)}{n}} \end{pmatrix}$$

تبدیل فوریه گسسته  $D_n$  یک ماتریس یکانی است که سطرهای (ستونهای) آن یک پایه متعامد یک برای  $\mathbb{C}^n$  تشکیل می‌دهند [۳، قضیه (۱۰.۴.۱)]. همچنین قدرمطلق همه درایه‌های  $D_n$  برابر  $\frac{1}{\sqrt{n}}$  است. تبدیل فوریه گسسته  $D_n$  ابزار اساسی در اثبات قضیه اصلی این مقاله است. همچنین از لم زیر از جبر خطی استفاده می‌شود.

لم ۳.۲. اگر  $A$  یک ماتریس  $m \times n$  با  $m < n$  باشد، آنگاه یک بردار ناصفر  $X$  با  $\|X\| = 1$  در  $\mathbb{C}^n$  وجود دارد به طوری که  $AX = 0$ .

در قضیه زیر با استفاده از تبدیل فوریه گسسته  $D_n$  یک کلاس از قاب‌های هم‌نرم ریس ناپذیر ساخته می‌شود.

قضیه ۴.۲. فرض کنید  $r \in \mathbb{N}, r \geq 2$  و  $A > 0$ . در این صورت یک کلاس از قاب‌های  $A$ -کیپ  $C$ -هم‌نرم وجود دارد که  $(\delta, r)$ -ریس پذیر نیست برای هر  $r \leq \frac{A}{C^2}$  و  $\delta > 0$  که در آن  $C \in \sqrt{\frac{A}{\mathbb{N}}}$ .

اثبات. فرض کنید  $A > 0, C \in \sqrt{\frac{A}{\mathbb{N}}}, r \in \mathbb{N}, 2 \leq r \leq \frac{A}{C^2}$  و  $\delta > 0$ . همچنین فرض کنید  $D_{rn}$  تبدیل فوریه گسسته  $rn \times rn$  باشد. فرض کنید  $D'_{rn}$  ماتریس  $rn \times rn$  حاصل از ضرب  $n-1$  ستون اول ماتریس  $D_{rn}$  در  $\sqrt{rC^2}$  و  $(r-1)n+1$  ستون باقیمانده در  $\sqrt{\frac{rC^2}{(r-1)n+1}}$  باشد. برای  $2 \leq i \leq \frac{A}{C^2}$ ,

فرض کنید  $D_{rn}^i$  ماتریس  $rn \times rn$  حاصل از ضرب  $n - 1$  ستون اول ماتریس  $D_{rn}$  در  $\sqrt{\frac{C^2(A-rC^2)}{A-C^2}}$  و  $(r-1)n + 1$  ستون باقیمانده در  $\sqrt{\frac{C^2[A(r-1)n+A-rC^2]}{(A-C^2)[(r-1)n+1]}}$  باشد، (جدول ۱ را ببینید).  
 اکنون فرض کنید  $D$  ماتریس  $rn \times rn$  حاصل از چیدن  $\frac{A}{C^2}$  تا ماتریس  $rn \times rn$   $\{D_{rn}^i\}_{i=1}^{\frac{A}{C^2}}$  روی همدیگر مطابق جدول ۱ باشد:

جدول ۱

	$(n-1) - Columns$	$[(r-1)n+1] - Columns$
$D_{rn}^1$	$\sqrt{rC^2}$	$\sqrt{\frac{rC^2}{(r-1)n+1}}$
$D_{rn}^2$	$\sqrt{\frac{C^2(A-rC^2)}{A-C^2}}$	$\sqrt{\frac{C^2[A(r-1)n+A-rC^2]}{(A-C^2)[(r-1)n+1]}}$
$D_{rn}^3$	$\sqrt{\frac{C^2(A-rC^2)}{A-C^2}}$	$\sqrt{\frac{C^2[A(r-1)n+A-rC^2]}{(A-C^2)[(r-1)n+1]}}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
$\frac{A}{C^2} D_{rn}^{\frac{A}{C^2}}$	$\sqrt{\frac{C^2(A-rC^2)}{A-C^2}}$	$\sqrt{\frac{C^2[A(r-1)n+A-rC^2]}{(A-C^2)[(r-1)n+1]}}$

همچنین فرض کنید  $\{f_i\}_{i=1}^{\frac{A}{C^2}rn}$  بردارهای سطری ماتریس  $D$  که عضو  $\mathbb{C}^{rn}$  هستند، باشند و  $\{g_i\}_{i=1}^{rn}$  بردارهای ستونی ماتریس  $D$  که عضو  $\mathbb{C}^{\frac{A}{C^2}rn}$  هستند، باشند.  
 برای  $1 \leq i \leq rn$  داریم:

$$\begin{aligned} \|f_i\|^2 &= \frac{1}{rn} \left[ (n-1)rC^2 + [(r-1)n+1] \frac{rC^2}{(r-1)n+1} \right] \\ &= C^2, \end{aligned}$$

و برای  $rn + 1 \leq i \leq \frac{A}{C^r} rn$  داریم:

$$\begin{aligned} \|f_i\|^2 &= \frac{1}{rn} \left[ (n-1) \frac{C^r(A - rC^r)}{A - C^r} + [(r-1)n + 1] \frac{C^r[A(r-1)n + A - rC^r]}{(A - C^r)[(r-1)n + 1]} \right] \\ &= C^r. \end{aligned}$$

همچنین برای  $1 \leq i \leq n-1$  داریم:

$$\begin{aligned} \|g_i\|^2 &= rn \left( \frac{1}{rn} \right) (rC^r) + \left( \frac{A}{C^r} - 1 \right) (rn) \left( \frac{1}{rn} \right) \left( \frac{C^r(A - rC^r)}{A - C^r} \right) \\ &= A, \end{aligned}$$

و برای  $n \leq i \leq rn$  داریم:

$$\begin{aligned} \|g_i\|^2 &= rn \left( \frac{1}{rn} \right) \left( \frac{rC^r}{(r-1)n + 1} \right) + \left( \frac{A}{C^r} - 1 \right) (rn) \left( \frac{1}{rn} \right) \left( \frac{C^r[A(r-1)n + A - rC^r]}{(A - C^r)[(r-1)n + 1]} \right) \\ &= A. \end{aligned}$$

بنابراین طبق گزاره ۲.۲ برای هر  $n \in \mathbb{N}$  دنباله  $\{f_i\}_{i=1}^{\frac{A}{C^r} rn}$  یک قاب  $A$ -کیپ  $C$ -هم‌نرم است. اکنون فرض کنید  $\{I_j\}_{j=1}^r$  یک افراز از  $\{1, 2, \dots, \frac{A}{C^r} rn\}$  باشد. بنابراین  $1 \leq j \leq \frac{A}{C^r} rn$  وجود دارد به طوری که مجموعه  $I_j \cap \{1, 2, \dots, rn\}$  حداقل دارای  $n$  عضو است. چون  $I_j$  حداقل دارای  $n$  عضو است لذا طبق لم ۳.۲ اسکالرهای  $\{c_i\}_{i \in I_j}$  وجود دارند به طوری که  $\sum_{i \in I_j} |c_i|^2 = 1$  و  $P_{n-1}(\sum_{i \in I_j} c_i f_i) = 0$  که در آن  $P_{n-1}$  تصویر متعامد از  $\mathbb{C}^m$  به روی  $n-1$  مختص اول است. اکنون فرض کنید  $I_j^m = I_j \cap \{1, 2, \dots, rn\}$  و  $\{h_i\}_{i=1}^m$  سطرهای تبدیل فوریه گسسته  $D_{rn}$  باشند. در این صورت برای هر  $i \in I_j^m$  داریم  $1 \leq i \leq rn$  و لذا

$$f_i = \left[ \sqrt{rC^r} h_{i1}, \sqrt{rC^r} h_{i2}, \dots, \sqrt{rC^r} h_{i(n-1)}, \sqrt{\frac{rC^r}{(r-1)n+1}} h_{in}, \dots, \sqrt{\frac{rC^r}{(r-1)n+1}} h_{i(rn)} \right],$$

که در آن  $h_i = [h_{i1}, \dots, h_{i(rn)}]$  چون  $I - P_{n-1}$  تصویر متعامد از  $\mathbb{C}^{rn}$  بروی  $(r-1)n + 1$  مختص دوم است لذا

$$\begin{aligned} (I - P_{n-1})f_i &= \left[ 0, 0, \dots, 0, \sqrt{\frac{rC^2}{(r-1)n+1}}h_{i1}, \dots, \sqrt{\frac{rC^2}{(r-1)n+1}}h_{i(rn)} \right] \\ &= \sqrt{\frac{rC^2}{(r-1)n+1}} \left[ 0, 0, \dots, 0, h_{i1}, \dots, h_{i(rn)} \right] \\ &= \sqrt{\frac{rC^2}{(r-1)n+1}} (I - P_{n-1}) [h_{i1}, h_{i2}, \dots, h_{i1}, \dots, h_{i(rn)}] \\ &= \sqrt{\frac{rC^2}{(r-1)n+1}} (I - P_{n-1}) h_i. \end{aligned}$$

چون  $\{h_i\}_{i=1}^{rn}$  یک پایه متعامد یکه برای  $\mathbb{C}^{rn}$  است، برای  $n$  های به قدر کافی بزرگ داریم:

$$\begin{aligned} \left\| \sum_{i \in I_j^n} c_i f_i \right\|^2 &= \left\| (I - P_{n-1}) \left( \sum_{i \in I_j^n} c_i f_i \right) \right\|^2 \\ &= \frac{rC^2}{(r-1)n+1} \left\| (I - P_{n-1}) \left( \sum_{i \in I_j^n} c_i h_i \right) \right\|^2 \\ &\leq \frac{rC^2}{(r-1)n+1} \left\| \sum_{i \in I_j^n} c_i h_i \right\|^2 \\ &\leq \frac{rC^2}{(r-1)n+1} \sum_{i \in I_j^n} |c_i|^2 \\ &< \delta \sum_{i \in I_j^n} |c_i|^2. \end{aligned}$$



□ لذا  $\{f_i\}_{i=1}^m$  یک دنباله  $(\delta, r)$ -ریس‌پذیر نیست.

قضیه بعدی فوراً از حدس فایتینگر و قضیه ۴.۲ نتیجه می‌شود.

قضیه ۵.۲. فرض کنید  $A, C > 0$  داده شده باشند. یک ثابت کلی  $\delta > 0$  مستقل از  $n$  وجود دارد به طوری که هر قاب  $A$ -کیپ  $C$ -هم‌نرم برای  $\mathbb{C}^n$  را می‌توان به  $r > \frac{A}{C}$  دنباله پایه ریس با کران پایه ریس  $\delta$  افزایش کرد.

## مراجع

- [1] P.G. Casazza, O. Christensen, A.M. Lindner, and R. Vershynin, A decomposition theorem for frames and the Feichtinger conjecture, *Proceedings of the American Mathematical Society*, **136**(6) (2008), 2043–2053.
- [2] P.G. Casazza, M. Fickus, D. Mixon and J.C. Tremain, The Bourgain-Tzafriri conjecture and concrete construction of non-pavable projections, *Operators and Matrices*, **5**(2) (2011), 353–363.
- [3] O. Christensen, *An Introduction to Frames and Riesz Bases*, Birkhäuser, Boston, Basel, Berlin, 2002.
- [4] C. Heil, D. Walnut, Continuous and discrete wavelet transform, *SIAM Rev.*, **31**(4) (1969), 628–666.
- [5] A. Marcus, D. Spielman and N. Srivastava, Interlacing families II: Mixed Characteristic Polynomials and the Kadison-Singer Problem, *arXiv:1306.3969 [math.CO]*.
- [6] N. Weaver, The Kadison-Singer Problem in discrepancy theory, *Discrete Math.*, **278**(1-3) (2004), 227–239.
- [7] R. Young, *An Introduction to Nonharmonic Fourier Series*, Academic Press, New York, 1980.